

Οικογένεια *Compositae* (*Asteraceae*)

***Hirtellina fruticosa* (L.) Dittrich**

Συνώνυμο: *Staehelina fruticosa* (L.) L.

Γεωγραφική κατανομή: Δυτ. & Αν. Κρήτη, περιοχή Καρπάθου, Κυκλάδες, νησιά Ανατ. Αιγαίου

Ενδημισμός: ενδημικό Νοτίου Αιγαίου

Οικότοπος: κρημνοί ασβεστούχων υποστρωμάτων (υψ. 0-1800 m)

Σύντομη περιγραφή: Θάμνος με βλαστούς που φτάνουν τα 150 cm, λίγο χνουδωτοί, αδενώδεις. Φύλλα ακέραια, λογχοειδή, σχεδόν λεία που συνήθως σχηματίζουν ρόδακες στα άκρα των βλαστών. Κεφάλια σε κυματοειδείς ταξιανθίες. Περιβληματικά βράκτια οξύληκτα, λεία, καφετιά, τα κατώτερα πράσινα στην άκρη. Στεφάνη λευκωπή. Αχαίνια μήκους 5-6 mm, με λευκές τρίχες και πάππο μήκους 10-12 mm.

Περίοδος ανθοφορίας: Σεπτέμβριος-Νοέμβριος

Κοινά ονόματα (στην Κρήτη):

Χρήσεις:

Κατάσταση διατήρησης (για απειλούμενα είδη): Σπάνιο (R) σύμφωνα με IUCN 1997

Καθεστώς προστασίας (για απειλούμενα είδη): Π.Δ. 67/1981

Κωδικοί δειγμάτων Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ: 3610, 3643, 394

Βιβλιογραφικές αναφορές:

Jahn R. & Schonfelder, P. 1995. Exkursionsflora für Kreta. Eugen Ulmer GmbH & Co. Germany. 446 pp

Turland, N.J. 1992a. Floristic notes from Crete. Botanical Journal of the Linnean Society. 108: 345-357.

Tutin, T. G. et al (eds). Flora Europaea Vol. 4. p. 217. (as *Staehelina*

fruticosa). Cambridge University Press.

Zaffran J., 1990. Contributions a la Flore et la Vegetation de la Crete.
Publications de l'Universite de Provence

Σφήκας Γ. 1987. Αγριολούλουδα της Κρήτης. Εκδόσεις Ευσταθιάδης & Υιοί,
Αθήνα. 310 σελ.