

Οικογένεια *Araceae*

***Biarum tenuifolium* (L.) Schott subsp. *idomenaeum* P.C.Boyce  
& Athanasiou**

**Γεωγραφική κατανομή:** Κεντρ.& Ανατ.Κρήτη

**Ενδημισμός:** ενδημικό Κρήτης

**Οικότοπος:** ασβεστολιθικά πετρώδη εδάφη με πρίνους (*Quercus coccifera*), φρύγανα, κοιλότητες εδάφους μέσα και ανάμεσα σε βράχους (υψ. 50-1500 m)

**Σύντομη περιγραφή:** Μικρό φυτό με γραμμοειδή-λογχοειδή φύλλα, κυματιστά, με μικρό μίσχο, εμφανιζόμενα αμέσως μετά την άνθιση. Σπάθη 8-20(-30) cm, το κάτω σωληνοειδές μέρος 2,5-6 cm λευκωπό, έλασμα λογχοειδές με αιχμηρή απόληξη, καστανοπόρφυρο, με πράσινη απόχρωση εξωτερικά. Σπάδικας καστανόμαυρος, πολύ λεπτός, λίγο μακρύτερος από τη σπάθη.

**Περίοδος ανθοφορίας:** Οκτώβριος-Νοέμβριος

**Κοινά ονόματα (στην Κρήτη):**

**Χρήσεις:**

**Κατάσταση διατήρησης (για απειλούμενα είδη):** Σπάνιο (R) σύμφωνα με IUCN 1997

**Καθεστώς προστασίας (για απειλούμενα είδη):**

**Κωδικοί δειγμάτων Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ:** 6189

**Βιβλιογραφικές αναφορές:**

Boyce, P. & Athanasiou, K. 1991. A new subspecies of *Biarum tenuifolium* (*Araceae*) from Crete. *Fl.Medit.*1: 5-13.

Jahn R. & Schonfelder, P. 1995. *Exkursionsflora für Kreta*. Eugen Ulmer GmbH & Co. Germany. 446 pp

Turland, N.J. 1992b. Studies on the Cretan flora 1. Floristic notes. *Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Bot.)* 22(2): 159-164

Tutin, T. G. et al (eds). *Flora Europaea* Vol. 5. p.271. Cambridge University Press.

Καββάδας, Δ., 1956-1964 Εικονογραφημένο Βοτανικόν Φυτολογικόν Λεξικόν. Τόμοι I - IX. Εκδ.Πήγασος, Αθήνα

Σφήκας Γ. 1987. *Αγριολούλουδα της Κρήτης*. Εκδόσεις Ευσταθιάδης & Υιοί, Αθήνα. 310 σελ.