

Οικογένεια *Campanulaceae*

***Campanula laciniata* L.**

Γεωγραφική κατανομή: Δυτ. & Ανατ.Κρήτη, Κάρπαθος, Κυκλάδες

Ενδημισμός: ενδημικό Νοτίου Αιγαίου

Οικότοπος: ασβεστώδεις βράχοι (υψ. 0-550 m)

Σύντομη περιγραφή: Διετές, χνουδωτό με χοντρή ξυλώδη βάση. Βλαστός 20-45(-60) cm, όρθιος συνήθως διακλαδιζόμενος. Φύλλα βάσης μέχρι 30 cm, ωοειδή-λογχοειδή, κροσσωτά και οδοντωτά, έμμισχα. Φύλλα του βλαστού ωοειδή, ελαφρώς κροσσωτά ή οδοντωτά, επιφυή ή σχεδόν άμισχα. Ταξιανθία βότρυς ή φόβη με πολλά μεγάλα άνθη με ποδίσκο. Στεφάνη κωδωνοειδής, βελούδινη, γαλάζια, 2-3 φορές μεγαλύτερη από τα δόντια του κάλυκα.

Περίοδος ανθοφορίας: Απρίλιος-Ιούνιος

Κοινά ονόματα (στην Κρήτη):

Χρήσεις:

Κατάσταση διατήρησης (για απειλούμενα είδη): Σπάνιο (R) σύμφωνα με Κόκκινο Βιβλίο Σπανίων & Απειλουμένων Φυτών της Ελλάδας (1995) - Απειλούμενο αλλά απροσδιόριστης κατηγορίας (I) σύμφωνα με IUCN 1997

Καθεστώς προστασίας (για απειλούμενα είδη): Π.Δ. 67/1981

Κωδικοί δειγμάτων Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ: 5936, 6093

Βιβλιογραφικές αναφορές:

Greuter, W. 1973. Additions to the flora of Crete, 1938-1972. Ann.Musei Goulandris 1: 15-83

Jahn R. & Schonfelder, P. 1995. Exkursionsflora für Kreta. Eugen Ulmer GmbH & Co. Germany. 446 pp

Phitos, D. and Kamari, G. 1984. Cytotaxonomical contributions on the flora of Crete. II. Candollea 39: 447-451.

Phitos, D., Strid, A., Snogerup, S., Greuter, W. (eds) 1995. The Red Data Book of rare and threatened plants of Greece. World Wide Fund for Nature. Publish.: K. Michalas S. A. Athens. 528p.

- Turland, N.J., Chilton, L. 2007. FLORA OF CRETE: Supplement II, Additions 1997-2007 (electronic edition- last updated January 2007)
<http://www.marengowalks.com/fcs.html>
- Tutin, T. G. et al (eds). Flora Europaea Vol. 4. p. 82. Cambridge University Press.
- Καββάδας, Δ., 1956-1964 Εικονογραφημένο Βοτανικόν Φυτολογικόν Λεξικόν. Τόμοι I - IX. Εκδ.Πήγασος, Αθήνα
- Σφήκας Γ. 1987. Αγριολούλουδα της Κρήτης. Εκδόσεις Ευσταθιάδης & Υιοί, Αθήνα. 310 σελ.