

Οικογένεια *Liliaceae*

***Androcymbium rechingeri* Greuter**

Γεωγραφική κατανομή: Δυτ.Κρήτη

Ενδημισμός: ενδημικό Κρήτης

Οικότοπος: Αμμώδεις κοιλότητες εδάφους ανάμεσα σε φρύγανα, αμμώδεις ακτές (υψ. 0-25 m)

Σύντομη περιγραφή: Μικρό, βολβώδες πολυετές φυτό, με βλαστό ύψους 2-7(-10) cm. Φύλλα μήκους 20-150 mm, γραμμοειδή έως λογχοειδή, επίπεδα ή ελαφρώς πτυχωτά, λεία, ανοικτά, μερικές φορές γυριστά προς τα έξω. Άνθη συχνά περισσότερα από 4, λευκά, συνήθως με επιμήκεις μωβ λεπτές ρίγες, με μικρό ποδίσκο. Πέταλα μήκους 20-25 mm, το έλασμα σχεδόν διπλάσιο σε μήκος από τον όνυχα, οξύληκτο. Καρπός κάψα μήκους 6-8 mm.

Περίοδος ανθοφορίας: Δεκέμβριος-Φεβρουάριος

Κοινά ονόματα (στην Κρήτη):

Χρήσεις:

Κατάσταση διατήρησης (για απειλούμενα είδη): Κινδυνεύον (Ε) σύμφωνα με Κόκκινο Βιβλίο Σπανίων & Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας (1995)

Καθεστώς προστασίας (για απειλούμενα είδη): Π.Δ. 67/1981, Συνθήκη της Βέρνης, Ευρ.Οδηγία 1992/43 (Παραρτ.II*/IV)

Κωδικοί δειγμάτων Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ: 7455, 7454, 7466, 3723, 2007, 1727

Βιβλιογραφικές αναφορές:

Greuter W. 1967. Contributiones floristicae austro-aegeae 10-12. Candollea 22:233-253.

Phitos, D., Strid, A., Snogerup, S., Greuter, W. (eds) 1995. The Red Data Book of rare and threatened plants of Greece. World Wide Fund for Nature. Publish.: K. Michalas S. A. Athens. 528p.

Turland, N.J., Chilton, L. & J.R. Press. 1993. Flora of the Cretan Area. Annotated Checklist & Atlas. The Natural History Museum. St Edmundsbury Press, Bury St. Edmunds, Suffolk, England.

Turland, N.J., Chilton, L., 2007. FLORA OF CRETE: Supplement II, Additions 1997-2007 (electronic edition- last updated January 2007)
<http://www.marengowalks.com/fcs.html>

Tutin, T. G. (eds.) Flora Europaea Vol. 5. p. 21. Cambridge University Press.

Γεωργίου Κ. & Δεληπέτρου Π. 2001. Απειλούμενα Ενδημικά είδη Χλωρίδας στη Νότια Ελλάδα. Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακό Ταμείο, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

Σφήκας Γ. 1987. Αγριολούλουδα της Κρήτης. Εκδόσεις Ευσταθιάδης & Υιοί, Αθήνα. 310 σελ.