

Οικογένεια *Scrophulariaceae*

***Veronica thymifolia* Sm.**

Γεωγραφική κατανομή: Κρήτη, Κεντρ. & Νότ.Ελλάδα

Ενδημισμός:

Οικότοπος: βραχώδεις θέσεις, ασβεστούχα χαλάσματα (υψ. 1500-2350 m)

Σύντομη περιγραφή: Πολυετές φυτό με πυκνό τρίχωμα και βλαστούς απλωτούς, ξυλώδεις στη βάση. Φύλλα μήκους 4-6 mm, στενά επιμήκη προς αντιλογχοειδή-σπαθιοειδή, ακέραια με ανεστραμμένες άκρες. Ταξιανθία 1-2 βότρες, πολύ κοντοί και με λίγα άνθη, ποδίσκοι μικρότεροι από τα βράκτια. Κάλυκας μήκους 3 mm, στεφάνη διαμέτρου 7-8 mm, γαλάζια, βιολετι ή ρόδινη. Κάψα 4 x4 mm, αντικαρδιοειδής, χνουδωτή.

Περίοδος ανθοφορίας: Μάιος-Ιούνιος

Κοινά ονόματα (στην Κρήτη):

Χρήσεις:

Κατάσταση διατήρησης (για απειλούμενα είδη):

Καθεστώς προστασίας (για απειλούμενα είδη): Π.Δ. 67/1981

Κωδικοί δειγμάτων Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ: 5027, 1448, 1148

Βιβλιογραφικές αναφορές:

Jahn R. & Schonfelder, P. 1995. Exkursionsflora für Kreta. Eugen Ulmer GmbH & Co. Germany. 446 pp

Montmollin De P. 1987. Contribution a l'étude cytotaxonomique de la flore cretoise et en particulier de ses endemiques.

Strid, A., and Tan, K. 1991. Mountain flora of Greece. Vol.2. Edinburgh.

Turland, N.J., Chilton, L. & J.R. Press. 1993. Flora of the Cretan Area. Annotated Checklist & Atlas. The Natural History Museum. St Edmundsbury Press, Bury St. Edmunds, Suffolk, England.

Tutin, T. G. et al (eds). Flora Europaea Vol. 3. p. 246. Cambridge University

Press.

Καββάδας, Δ., 1956-1964 Εικονογραφημένο Βοτανικόν Φυτολογικόν Λεξικόν.
Τόμοι Ι - ΙΧ. Εκδ.Πήγασος, Αθήνα

Σφήκας Γ. 1987. Αγριολούλουδα της Κρήτης. Εκδόσεις Ευσταθιάδης & Υιοί,
Αθήνα. 310 σελ.