

Οικογένεια *Ranunculaceae*

***Ranunculus subhomophyllus* (Halácsy) Vierh.**

Γεωγραφική κατανομή: Δυτ.Κρήτη, Κάρπαθος, Πελοπόννησος, νησιά Αν.Αιγαίου

Ενδημισμός: ενδημικό Ν. Ελλάδας

Οικότοπος: Βραχώδεις θέσεις και σχισμές βράχων σε ασβεστούχα εδάφη, αμμώδεις κοιλότητες εδάφους σε βράχους (υψ. 1300-1850 m)

Σύντομη περιγραφή: Πολυετής, λεπτή και σχεδόν λεία πόα, καθόλου ή λίγο διακλαδισμένη με προμήκεις κονδύλους στη ρίζα. Φύλλα βάσης σφαιρικά ή επιμήκη, τρισχιδή με αμβλείς λοβούς. Άνθη 1-2, κίτρινα. Αχαίνια με ράμφος.

Περίοδος ανθοφορίας: Απρίλιος-Μάιος

Κοινά ονόματα (στην Κρήτη):

Χρήσεις:

Κατάσταση διατήρησης (για απειλούμενα είδη): Σπάνιο (R) σύμφωνα με IUCN 1997

Καθεστώς προστασίας (για απειλούμενα είδη): Π.Δ. 67/1981

Κωδικοί δειγμάτων Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ: 2208

Βιβλιογραφικές αναφορές:

Jahn R. & Schonfelder, P. 1995. Exkursionsflora für Kreta. Eugen Ulmer GmbH & Co. Germany. 446 pp

Turland, N.J., Chilton, L. & J.R. Press. 1993. Flora of the Cretan Area. Annotated Checklist & Atlas. The Natural History Museum. St Edmundsbury Press, Bury St. Edmunds, Suffolk, England.

Tutin, T. G. et al (eds). Flora Europaea Vol. 1. p. 231. Cambridge University Press.

Σφήκας Γ. 1987. Αγριολούλουδα της Κρήτης. Εκδόσεις Ευσταθιάδης & Υιοί, Αθήνα. 310 σελ.