

Οικογένεια *Umbelliferae* (*Apiaceae*)

***Chaerophyllum creticum* Boiss. & Heldr.**

Γεωγραφική κατανομή: Δυτ.Κρήτη (Λευκά Όρη)

Ενδημισμός: ενδημικό Κρήτης

Οικότοπος: Ανάμεσα σε ακανθώδη φυτά, ιδιαίτερα σε *Berberis cretica*, σε βαθύ πηλώδες έδαφος σε ασβεστόλιθο (υψ. 1050-1450 m).

Σύντομη περιγραφή: Πολυετές, τριχωτό ποώδες φυτό που φτάνει σε ύψος τα 50 cm. Φύλλα τρισχιδή με λοβούς μέχρι 2 mm πλάτους, γραμμοειδείς-λογχοειδείς. Βράκτια και βρακτίδια λογχοειδή, μερικές φορές διαιρεμένα στην κορυφή. Άνθη κίτρινα σε ομάδες διαταγμένες σε σχήμα "ομπρέλλας" (σκιάδιο). Τα μικρά σκιάδια σχηματίζουν 1 μεγάλο στην άκρη του βλαστού (σύνθετο σκιάδιο). Καρπός 17-25 mm.

Περίοδος ανθοφορίας: Απρίλιος-Ιούλιος

Κοινά ονόματα (στην Κρήτη):

Χρήσεις:

Κατάσταση διατήρησης (για απειλούμενα είδη): Τρωτό (V) σύμφωνα με Κόκκινο Βιβλίο Σπανίων & Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας (1995) - Τρωτό (V) σύμφωνα με IUCN 1997

Καθεστώς προστασίας (για απειλούμενα είδη): Π.Δ. 67/1981

Κωδικοί δειγμάτων Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ: 5873

Βιβλιογραφικές αναφορές:

Phitos, D., Strid, A., Snogerup, S., Greuter, W. (eds) 1995. The Red Data Book of rare and threatened plants of Greece. World Wide Fund for Nature. Publish.: K. Michalas S. A. Athens. 528p.

Turland, N.J., Chilton, L. & J.R. Press. 1993. Flora of the Cretan Area. Annotated Checklist & Atlas. The Natural History Museum. St Edmundsbury Press, Bury St. Edmunds, Suffolk, England.

Tutin, T. G. et al (eds). Flora Europaea Vol. 2. p. 325. Cambridge University Press.

Γεωργίου Κ. & Δεληπέτρου Π. 2001. Απειλούμενα Ενδημικά είδη Χλωρίδας

στη Νότια Ελλάδα. Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακό Ταμείο, Μουσείο
Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

Καββάδας, Δ., 1956-1964 Εικονογραφημένο Βοτανικόν Φυτολογικόν Λεξικόν.
Τόμοι Ι - ΙΧ. Εκδ.Πήγασος, Αθήνα

Σφήκας Γ. 1987. Αγριολούλουδα της Κρήτης. Εκδόσεις Ευσταθιάδης & Υιοί,
Αθήνα. 310 σελ.