

Οικογένεια *Rubiaceae*

***Asperula tournefortii* Sieber ex Spreng.**

Γεωγραφική κατανομή: ευρύτερη περιοχή Κρήτης και Νησιά Αν.Αιγαίου (Χάλκη, Ρόδος)

Ενδημισμός: ενδημικό Νοτίου Αιγαίου

Οικότοπος: Κρημνοί σε ασβεστούχο πέτρωμα (υψ. 50-800 m)

Σύντομη περιγραφή: Θάμνος γλαυκοπράσινος με βλαστούς που φτάνουν μέχρι 30 cm ύψος, άκαμπτοι, ανθεκτικοί, λίγο έως πολύ ξυλώδεις στη βάση. Μεσογονάτια διαστήματα σχεδόν ίδιου μήκους με τα φύλλα. Φύλλα σε σπονδύλους των 6 (-7), αντωειδή, στρογγυλεμένα, παχειά, δερματώδη. Νεύρωση ελάχιστα προεξέχουσα. Ταξιανθία πυραμιδοειδής, συνήθως πυκνή, με πολλά άνθη, σχεδόν άμισχα. Βράκτια σχεδόν ίσου μήκους με τους καρπούς, λογχοειδή, τριχωτά, μη επιφυή στη βάση. Στεφάνη 3-5 mm, χοανοειδή, ωχροκίτρινη, συνήθως με μακριές τρίχες. Καρπός 1,5-2 mm χνουδωτός.

Περίοδος ανθοφορίας: Απρίλιος-Ιούνιος

Κοινά ονόματα (στην Κρήτη):

Χρήσεις:

Κατάσταση διατήρησης (για απειλούμενα είδη): Σπάνιο (R) σύμφωνα με IUCN 1997

Καθεστώς προστασίας (για απειλούμενα είδη): Π.Δ. 67/1981

Κωδικοί δειγμάτων Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ: 5922, 433, 409, 984, 1859

Βιβλιογραφικές αναφορές:

Jahn R. & Schonfelder, P. 1995. Exkursionsflora für Kreta. Eugen Ulmer GmbH & Co. Germany. 446 pp

Turland, N.J., Chilton, L. & J.R. Press. 1993. Flora of the Cretan Area. Annotated Checklist & Atlas. The Natural History Museum. St Edmundsbury Press, Bury St. Edmunds, Suffolk, England.

Tutin, T. G. et al (eds). Flora Europaea Vol.4. p.13. Cambridge University Press.

Zaffran J. 1990. *Contributions a la Flore et la Vegetation de la Crete*.
Publications de l'Universite de Provence

Καββάδας, Δ., 1956-1964 Εικονογραφημένο Βοτανικόν Φυτολογικόν Λεξικόν.
Τόμοι Ι - ΙΧ. Εκδ.Πήγασος, Αθήνα

Σφήκας Γ. 1987. *Αγριολούλουδα της Κρήτης*. Εκδόσεις Ευσταθιάδης & Υιοί,
Αθήνα. 310 σελ.