

Οικογένεια *Umbelliferae* (*Apiaceae*)

***Ferulago thyrsoiflora* (Sm.) W.D.J.Koch**

Γεωγραφική κατανομή: Κρήτη

Ενδημισμός: ενδημικό Κρήτης

Οικότοπος: κρημνοί ασβεστούχων υποστρωμάτων και σχισμές βράχων (υψ. 50-1200 m)

Σύντομη περιγραφή: Πολυετές, λείο φυτό γύρω στα 60 cm. Φύλλα τριγωνικά με λοβούς επιμήκεις, γραμμοειδείς. Άνθη κίτρινα σε σκιάδια, που είναι πυκνά συγκεντρωμένα σε πολυσχιδή φόβη. Βράκτια και βρακτίδια, γραμμοειδή-λογχοειδή. Καρπός μήκους 8-10 mm, με στενά, κάπως κυματοειδή πτερύγια πλευρικά και στενά ραχιαία πτερύγια.

Περίοδος ανθοφορίας: Ιούνιος-Ιούλιος

Κοινά ονόματα (στην Κρήτη):

Χρήσεις:

Κατάσταση διατήρησης (για απειλούμενα είδη): Σπάνιο (R) σύμφωνα με IUCN 1997

Καθεστώς προστασίας (για απειλούμενα είδη): Π.Δ. 67/1981

Κωδικοί δειγμάτων Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ: 5879, 5878, 6030

Βιβλιογραφικές αναφορές:

Jahn R. & Schonfelder, P. 1995. Exkursionsflora für Kreta. Eugen Ulmer GmbH & Co. Germany. 446 pp

Turland, N.J., Chilton, L., & J.R. Press. 1993. Flora of the Cretan Area. Annotated Checklist & Atlas. The Natural History Museum. St Edmundsbury Press, Bury St. Edmunds, Suffolk, England.

Tutin, T. G. et al (eds). Flora Europaea Vol. 2 p. 359. Cambridge University Press.

Zaffran J., 1990. Contributions a la Flore et la Vegetation de la Crete. Publications de l'Universite de Provence

Καββάδας, Δ., 1956-1964 Εικονογραφημένο Βοτανικόν Φυτολογικόν Λεξικόν. Τόμοι I - IX. Εκδ.Πήγασος, Αθήνα

Κυπριωτάκης Ζ. 1998. Συμβολή στη μελέτη της χασμοφυτικής χλωρίδας της Κρήτης και προτάσεις για τη διαχείριση της ως φυσικού πόρου (φυσιολατρικός τουρισμός, ανθοκομία, εθνοβοτανική κλπ.). Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών. 230 σελ.

Σφήκας Γ. 1987. Αγριολούλουδα της Κρήτης. Εκδόσεις Ευσταθιάδης & Υιοί, Αθήνα. 310 σελ.