

Οικογένεια *Compositae* (*Asteraceae*)

***Cirsium morinifolium* Boiss. & Heldr.**

Γεωγραφική κατανομή: Κρήτη

Ενδημισμός: ενδημικό Κρήτης

Οικότοπος: Ασβεστούχα ανοιχτά βραχώδη γκαρίγκ και φρύγανα, επίπεδες αργιλώδεις περιοχές (υψ. 1200-2100 m).

Σύντομη περιγραφή: Διετές φυτό 30-100 cm. Βλαστός με πολλές διακλαδώσεις, με αραιό χνούδι. Φύλλα σχεδόν λεία από πάνω, τριχωτά από κάτω, με λοβούς στενά τριγωνικούς προς λογχοειδείς με αγκάθι στην άκρη μήκους 7-11(-15) mm. Κεφάλια πολλά σε σε πολύκλαδη φόβη ή κόρυμβο με 8-12 ακανθωτά φύλλα. Βράκτια περιβλήματος αραιά τριχωτά σπάνια σχεδόν λεία, τα μεσαία βράκτια σταδιακά στενεύουν στην κορυφή με αγκάθι στην άκρη μήκους 1-2 mm. Στεφάνη μήκους 20-26 mm, λευκωπή ή ρόδινη. Αχαίνια περίπου 6 mm, πάππος μήκους περίπου 15 mm.

Περίοδος ανθοφορίας: Ιούλιος-Αύγουστος

Κοινά ονόματα (στην Κρήτη):

Χρήσεις:

Κατάσταση διατήρησης (για απειλούμενα είδη): Σπάνιο (R) σύμφωνα με IUCN 1997

Καθεστώς προστασίας (για απειλούμενα είδη): Π.Δ. 67/1981

Κωδικοί δειγμάτων Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ: 5243, 7705

Βιβλιογραφικές αναφορές:

Davis, P. H. 1953. Notes on the Summer Flora of the Aegean. Notes Roy.Bot.Gard.Edinburgh 21, p.101-142.

Jahn R. & Schonfelder, P. 1995. Exkursionsflora fur Kreta. Eugen Ulmer GmbH & Co. Germany. 446 pp

Montmollin De P. 1987. Contribution a l'etude cytotonomique de la flore cretoise et en particulier de ses endemiques. These presentee a la Faculte des Sciences de l' Universite de Neuchatel pp.194

Strid, A., and Tan, K. 1991. Mountain flora of Greece. Vol.2. Edinburgh.

Tutin, T. G. et al (eds). Flora Europaea Vol. 4. p. 235. Cambridge University Press.

Καββάδας, Δ., 1956-1964 Εικονογραφημένο Βοτανικόν Φυτολογικόν Λεξικόν. Τόμοι Ι - ΙΧ. Εκδ.Πήγασος, Αθήνα

Σφήκας Γ. 1987. Αγριολούλουδα της Κρήτης. Εκδόσεις Ευσταθιάδης & Υιοί, Αθήνα. 310 σελ.