

Οικογένεια *Compositae* (*Asteraceae*)

Centaurea raphanina* Sm. subsp. *raphanina

Γεωγραφική κατανομή: Κρήτη, Κάσος, Κάρπαθος

Ενδημισμός: ενδημικό Νοτίου Αιγαίου

Οικότοπος: απότομες πλαγιές, σχισμές βράχων, παλιοί τοίχοι, βραχώδη φρύγανα, γυμνό πετρώδες έδαφος, επίπεδες αργιλώδεις περιοχές (υψ. 0-2300 m)

Σύντομη περιγραφή: Φυτό πολυετές, σχεδόν χωρίς βλαστό ή σπάνια με βλαστό έως και 5(-20) cm. Φύλλα επιμήκη-λογχοειδή, ακέραια ή λυροειδή-πτεροσχιδή με λοβούς ακέραιους. Κεφάλια συνήθως σε ομάδες των 2-4, επιφυή ή με μικρό ποδίσκο. Ανθίδια ρόδινα ή πορφυρά, τα εξωτερικά λίγο μεγαλύτερα από τα εσωτερικά. Βράκτια υπανθίου ακέραια, με ακραίο αγκάθι 2-9 mm. Αχαίνια 3-5 mm, μεταξένια, πάππος ίσου μήκους ή μεγαλύτερος από το αχαίνιο.

Περίοδος ανθοφορίας: Απρίλιος-Ιούλιος

Κοινά ονόματα (στην Κρήτη):

Χρήσεις:

Κατάσταση διατήρησης (για απειλούμενα είδη):

Καθεστώς προστασίας (για απειλούμενα είδη):

Κωδικοί δειγμάτων Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ: 956, 1885, 1117, 1853, 1929

Βιβλιογραφικές αναφορές:

Greuter, W., 2003b. The Euro+Med treatment of Cardueae (Compositae) - generic concepts and required new names. Willdenowia 33: 49-61.

Turland, N.J., Chilton, L., 2007. FLORA OF CRETE: Supplement II, Additions 1997-2007 (electronic edition- last updated January 2007)

<http://www.marengowalks.com/fcs.html>

Tutin, T. G. et al (eds). Flora Europaea Vol. 4. p. 269. Cambridge University Press.

Καββάδας, Δ., 1956-1964 Εικονογραφημένο Βοτανικόν Φυτολογικόν Λεξικόν.
Τόμοι Ι - ΙΧ. Εκδ.Πήγασος, Αθήνα
Σφήκας Γ. 1987. Αγριολούλουδα της Κρήτης. Εκδόσεις Ευσταθιάδης & Υιοί,
Αθήνα. 310 σελ.